

## Bebeklerde Aşy Takvimi

Bebeklerde Aşy Takvimi Aşylar daha çok bulabycy hastalyklar ortaya cymadan önce bu hastalyklary önlemek için yapylr. Bu açan mikroplar öldürülerek, canlylyklary azaltylarak ya da tipleri deđiptirilerek aşy hazırlanlr. Bu aşy uygulanan kiři hastalydy g hastalyda bađypyklık kazanmıy olur. Hastalyklary önlemek onlary tedavi etmekten her zaman daha kolay hem daha güvenlidir. bebeklik döneminde uygulanan aşylar Verem (BCG) aşysı: Bebek iki ayıný doldurduktan sonra yapılmalydır. Bebeđe verem a yapıldıktan sonra 3 gün banyo yaptırılmamalydır. Verem aşysı ilk yapıldıdynda aşy yerinde hiçbir reaksiyon görülmez, ancak sonra aşy yerinde ufak bir kızaryklık ve sivilce benzeri bir ııplik saptanlr. Bu daha sonra kaybolarak yerinde ufak bir iz bırakılır. Yenidođan döneminden sonra da 5 yıl arayla 20 yaşına kadar aşy lama tekrarlanmalydır. Karma aşy (DBT): Karma aşy difteri, b ve tetanoz aşylarıný içerir. 2. 4. 6. aylarda, 18. ayda ve 4. yapta kas içine yapylr. Bu yaıptan sonra karma aşydan bođmaca aşy yapýnda difteri, tetanoz olarak yapylr. 10 yaşından sonra yapýlacaksa eriřkin tip difteri aşysı kullanılmalydır. Her 10 yılda bir tekrarlanmalydır. Aşy yerinde kızaryklık, ııplik, küçük bir ııplik geliıebilir. Bir süre sonra geđer. Aşıya bađly havale geđiren çocuk yapılmaz. Çocuk felci (polio) aşysı: Çocuk felci karma aşylarla aynı zamanda ađydan damla beklinde kullanılır. Canly aşydy durumlarda ölü aşy tercih edilmelidir. Ađydan verilen aşy kusulursa tekrarlanmalydır. Kızamık, kızamıkçyk, kabakulak aşyla hala kızamık meydana getirdiđi ölümler nedeniyle önemini koruduđundan rutin aşy programında kızamık aşysı 9. ayda yapılır. 15. aydaki tekrarı kızamık, kızamıkçyk, kabakulak kombine aşysı beklinde yapılması uygundur. Kızamık hamilelikte geđerildiđinde bebekte sakatlyklara neden olabileceđinden, dođurma yaşına gelmiř her geň kızın bu kızamıkçyk a yapıldıdyndan emin olunmalydır. 11 yaıplarında kızamık, kızamıkçyk, kabakulak kombine aşysınýn tekrarı gerekir. Hepatit B hepatit B taşıyıcılıdy %10 olarak bilinmektedir. Kan, kan ürünleri ve salgylarla bulababilir. Hepatit B ile enfekte kiřide ileride sirci karaciđer yetersizliđi geliıebilmektedir. Bu nedenle her yenidođan dođumdan hemen sonra, 1. ayda ve 6. ayda olacak beklide toplam 3 kez aşylanmalydır. fakat özellikle annede hepatit B taşıyıcılıdy tesbit edilmiřse bebeđe dođar dođmaz aşy ile birlikte Ýmmunglobulini verilmelidir. Hepatit A aşysı: Hepatit A, oral yolla bulaban bir enfeksiyon hastalydydır. Hijyen kurallarınýn düze ile hepatit A geđirme olasılıdy azalmaktadır. Hepatit A eriřkin yaıplarda geđerildiđinde daha ađy seyretmektedir. Hepatit A aşysı yapýndan sonra ve 6-12 ay arayla toplam iki doz yapılması önerilmektedir. Hemofilus Ýnfluenza B aşysı: Menenjit aşysı olarak bilinen bu aşy özellikle 3 ay-5 yaı arasý çocuklarda ađy menenhit, bođaz, kulak, burun, göz enfeksiyonu yapan hemofilus influenza B bakterisine karřy bađypyklık sađlar. Karma ve çocuk felci aşysı ile birlikte 2. 4. 6. aylarda yapýlabılır. 18. ayda tekrar edilir. Ýli yapılmamıy çocuklara 12. aydan sonra tek doz olarak yapylr. 6 aydan sonra yapıldıdynda 1 yaşına kadar iki doz, son dozdan sonra da 3.doz yapylr. Grip aşysı: Sonbaharda yapılması önerilen grip aşysı özellikle ana okuluna devam edenlere, kalp hastalıkları olanlara, sıyk akciđer enfeksiyonu geđirenlere, astım hastalarına yapılması gereklidir. Su çiçeđi aşysı: Canly bir aşydyr ve tek bađypyklık sađlar. Bir yaşından sonra yapılması önerilir. Risk grubu çocuklara yapılmalydır. ÇOCUK API TABLO

Ay	4 Ay	6 Ay	7 Ay	9 Ay	12 Ay
BCG (Verem)			+		
Hepatit-B		+	+		+
Difteri				+	+
Tetanoz			+	+	+
Bođmaca				+	+
Çocuk Felci				+	+
HIB*				+	+
Kızamık			+		
MMR**					+
Su Çiçeđi				+	+

x bilinir

x Hekim tarafından gerekli görülürse yapylr

\* HIB: Haemophilus ýnfluenza tip-b -menenjit aşysı olarak

\*\* MMR: kızamık, kızamıkçyk, kabakulak aşysı